

MAVYRET® (MAV-ih-reht) (glecaprevir and pibrentasvir) tablets

MAVYRET® (MAV-ih-reht) (glecaprevir and pibrentasvir) oral pellets

**BREVE RESUMEN
PARA EL CONSUMIDOR**
Consulte el prospecto del envase
para obtener la información de
prescripción completa

Información para el paciente

Lea la Información para el paciente que viene con **MAVYRET** antes de comenzar a tomarlo y cada vez que renueve la receta. Es posible que haya nueva información. Este breve resumen no es completo y no reemplaza la conversación con su médico sobre su condición médica o tratamiento. Para obtener una copia completa de la Información de prescripción, visite www.MAVYRET.com o llame al 1-800-633-9110.

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de MAVYRET?

MAVYRET puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos los siguientes:

Reactivación del virus de la hepatitis B. Antes de comenzar el tratamiento con MAVYRET, su médico le hará un análisis de sangre para detectar una infección por el virus de la hepatitis B. Si alguna vez ha estado infectado con el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis B podría activarse de nuevo durante o después del tratamiento para el virus de la hepatitis C con MAVYRET. El virus de la hepatitis B que se activa nuevamente (denominada reactivación) puede ocasionar problemas de hígado graves que incluyen la insuficiencia hepática y la muerte. Su médico lo controlará si está en riesgo de tener una reactivación del virus de la hepatitis B durante el tratamiento y después de que deje de usar MAVYRET.

Para obtener más información sobre los efectos secundarios, consulte la sección “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MAVYRET?”.

¿Qué es MAVYRET?

MAVYRET es un medicamento de venta con receta que se usa para el tratamiento de adultos y niños de 3 años de edad y más, con las siguientes afecciones:

- Infección aguda (infección reciente) o crónica (prolongada en el tiempo) por los genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 del virus de la hepatitis C (VHC), sin cirrosis o con cirrosis compensada.
- Infección por el genotipo 1 del VHC que han sido tratados previamente con un régimen que incluía un inhibidor de NS5A del VHC o un inhibidor de la proteasa (IP) NS3/4A, pero no ambos.

MAVYRET contiene 2 medicamentos: glecaprevir y pibrentasvir.

Se desconoce si MAVYRET es seguro y eficaz en niños menores de 3 años.

No tome MAVYRET si:

- Tiene deterioro hepático moderado o grave (Child-Pugh B o C), o algún antecedente de descompensación hepática previa.
- También usa cualquiera de los siguientes medicamentos:
 - atazanavir
 - rifampicina

Antes de tomar MAVYRET, informe a su médico sobre todas las afecciones médicas que tenga, incluido lo siguiente:

- Si ha tenido una infección por el virus de la hepatitis B.
- Si tiene problemas de hígado, además de la infección por el virus de la hepatitis C.
- Si tiene una infección por VIH-1.
- Si ha tenido un trasplante de hígado o riñón.
- Está embarazada o planifica quedar embarazada. Se desconoce si MAVYRET puede dañar a un bebé en gestación.

- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si MAVYRET pasa a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con MAVYRET.

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que esté utilizando, incluidos medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

MAVYRET y otros medicamentos pueden afectarse mutuamente. Esto puede hacer que tenga exceso o insuficiencia de MAVYRET u otros medicamentos en el cuerpo. Esto puede afectar la forma en que MAVYRET o los otros medicamentos actúan, o puede ocasionar efectos secundarios.

Mantenga una lista de sus medicamentos para mostrársela a su médico y a su farmacéutico.

- Puede pedirle a su médico o farmacéutico una lista de los medicamentos que interactúan con MAVYRET.
- **No comience a tomar un nuevo medicamento sin consultar a su médico.** Su médico puede informarle si es seguro tomar MAVYRET con otros medicamentos.

¿Cómo debo tomar MAVYRET?

- Tome MAVYRET exactamente como lo indique su médico. No cambie su dosis, a menos que su médico se lo indique.
- No deje de tomar MAVYRET sin antes hablar con su médico.
- No omita ni saltee las dosis de MAVYRET durante el tratamiento.
- Tome MAVYRET con alimentos.
- Para adultos, adolescentes de 12 años o mayores, o niños que pesen al menos 99 libras (45 kg), la dosis habitual de MAVYRET es de 3 comprimidos al mismo tiempo cada día.
- Para niños de 3 a menores de 12 años de edad y que pesen menos de 99 libras (45 kg), el médico de su hijo le recetará la dosis adecuada de los gránulos para uso oral de MAVYRET en función del peso corporal de su hijo.
 - Si el médico de su hijo le receta gránulos para uso oral a su hijo, consulte “**¿Cómo debo administrarle los gránulos para uso oral de MAVYRET a mi hijo?**”.
- Si omite una dosis de MAVYRET y pasaron:
 - Menos de 18 horas desde el momento en que habitualmente toma MAVYRET, tome la dosis omitida junto con alimentos lo antes posible. Luego tome su siguiente dosis en el horario habitual.
 - Más de 18 horas desde el momento en que habitualmente toma MAVYRET, no tome la dosis omitida. Tome la siguiente dosis en el horario habitual, con alimentos.
- Si toma demasiado MAVYRET, llame a su médico o acuda de inmediato a la sala de emergencias del hospital más cercano.

¿Cómo debo administrarle los gránulos para uso oral de MAVYRET a mi hijo?

Consulte las Instrucciones de uso detalladas para obtener información sobre cómo administrar o tomar una dosis de los gránulos para uso oral de MAVYRET.

- Administre los gránulos para uso oral de MAVYRET exactamente como se lo indicó su médico.
- Administre MAVYRET 1 vez al día justo antes o después de un refrigerio o una comida.
- **No abra el paquete hasta que esté listo para su uso.**
- Mezcle los gránulos con una pequeña cantidad de un alimento recomendado y tráguelo (consulte las Instrucciones de uso para ver la lista de alimentos recomendados).
- Trague el alimento y la mezcla de gránulos orales dentro de los 15 minutos de la preparación. **No triture ni mastique los gránulos orales.**
- **No almacene ninguna mezcla sobrante (gránulos para uso oral de MAVYRET mezclados con alimentos) para usarla más adelante.** Deseche cualquier porción no utilizada.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MAVYRET?

MAVYRET puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos los siguientes:

- **Reactivación del virus de la hepatitis B.** Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de MAVYRET?”.
- **En personas que tuvieron o tienen problemas de hígado avanzados antes de comenzar el tratamiento con MAVYRET: riesgo raro de empeoramiento de problemas de hígado, insuficiencia hepática y la muerte.** Su médico lo controlará para detectar signos y síntomas de empeoramiento de problemas de hígado durante el tratamiento con MAVYRET. Informe a su médico de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos y síntomas:
 - náuseas
 - cansancio
 - coloración amarillenta de la piel o la parte blanca de los ojos
 - sangrado o formación de moretones más fácilmente que lo normal
 - confusión
 - heces oscuras, negras o con sangre
 - pérdida de apetito
 - diarrea
 - orina oscura o de color marrón (color té)
 - hinchazón o dolor en el lado superior derecho de la zona del estómago (abdomen)
 - somnolencia
 - vómitos de sangre
 - aturdimiento

Los efectos secundarios más frecuentes de MAVYRET incluyen dolor de cabeza y cansancio.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de MAVYRET.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo almacenar MAVYRET?	Gránulos para uso oral de MAVYRET:	
<ul style="list-style-type: none"> Almacene MAVYRET a 86 °F (30 °C) como máximo. Conserve MAVYRET en su envase original hasta que esté listo para tomarlo. 	Ingredientes activos: glecaprevir y pibrentasvir	
Mantenga MAVYRET y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.	Ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, copovidona (tipo K 28), croscarmelosa sódica, hipromelosa 2910, óxido de hierro rojo, óxido de hierro amarillo, monohidrato de lactosa, polietilenglicol/macrogol 3350, monocaprilato de propilenglicol (tipo II), estearil fumarato de sodio, dióxido de titanio y vitamina E (tocoferol) polietilenglicol succinato. Los gránulos para uso oral no contienen gluten.	
Información general sobre el uso seguro y eficaz de MAVYRET	Fabricado por AbbVie Inc., North Chicago, IL 60064.	
<p>A veces los medicamentos se recetan con fines distintos a los detallados en la hoja de Información para el paciente. No use MAVYRET para una afección para la que no fue recetado. No comparta MAVYRET con otras personas, aunque estas tengan los mismos síntomas que usted. Puede hacerles daño. Puede pedirle a su farmacéutico o a su médico información sobre MAVYRET que está publicada para profesionales de la salud.</p>	MAVYRET y su diseño son marcas comerciales de AbbVie Inc.	
¿Cuáles son los ingredientes de MAVYRET?	Se le recomienda informar a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al teléfono 1-800-FDA-1088.	
Comprimidos de MAVYRET	Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie podría brindarle ayuda. Visite AbbVie.com/PatientAccessSupport para obtener más información.	
Ingredientes activos: glecaprevir y pibrentasvir Ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, copovidona (tipo K 28), croscarmelosa sódica, hipromelosa 2910, óxido de hierro rojo, monohidrato de lactosa, polietilenglicol 3350, monocaprilato de propilenglicol (tipo II), estearil fumarato de sodio, dióxido de titanio y vitamina E (tocoferol) polietilenglicol succinato. Los comprimidos no contienen gluten.	Ref.: 20092779 Revisado: junio 2025	
	LAB-12951 VERSIÓN MAESTRA EN INGLÉS	
	LAB-13093 VERSIÓN MAESTRA EN ESPAÑOL	
	LAB-13095	
		