

患者信息

在开始服药之前以及每次再开配方之前，请阅读 UBRELVY® 随附的《患者信息》。可能存在新的信息。本简要总结并不全面，无法取代与您的医生讨论您的医疗状况或治疗。如需获取完整处方信息的副本，请访问 www.UBRELVY.com 或致电 1-844-4-UBRELVY (1-844-482-7358)。

UBRELVY 是什么？

UBRELVY 是一种处方药，用于有或无先兆的成人偏头痛发作的急性治疗。
UBRELVY 不用于预防偏头痛。
尚不清楚 UBRELVY 对儿童是否安全有效。

谁不应使用 UBRELVY？

如果您有以下情况，请勿服用 UBRELVY

- 正在使用称为 CYP3A4 强抑制剂的药物，如酮康唑、克拉霉素或伊曲康唑。如果您不确定自己是否正在使用任何这些药物，请咨询医务人员。医务人员可以告诉您 UBRELVY 与其他药物一起使用是否安全。
 - 对 Ubrogepant 或 UBRELVY 的任何成分过敏。UBRELVY 成分的完整列表请参见本消费者简要总结的末尾。
- 在服用 UBRELVY 之前，请将您的所有医疗状况告知您的医务人员，包括您是否有以下情况：
- 有肝脏问题
 - 有肾脏问题
 - 已怀孕或计划怀孕。尚不清楚 UBRELVY 是否会伤害胎儿。

- 妊娠登记研究：目前有一项针对服用 UBRELVY 的女性的妊娠登记研究。该登记研究的目的是收集有关您和您孩子健康状况的信息。请咨询医务人员或致电 1-833-277-0206 参加该登记研究。您也可以访问 <http://emprespregnancyregistry.com>。
- 正在哺乳或计划哺乳。尚不清楚 UBRELVY 是否会进入母乳。

请将您服用的所有药物告知医务人员，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。

特别是如果您使用以下任何药物，请告知医务人员，因为医务人员可能需要调整 UBRELVY 的剂量：

- 维拉帕米
- 环孢菌素
- 环丙沙星
- 氟康唑
- 氟伏沙明
- 苯妥英
- 巴比妥类
- 利福平
- 贯叶连翘
- 奎尼丁
- 卡维地洛
- 艾曲泊帕
- 姜黄素

以上并未涵盖可能影响 UBRELVY 作用方式的所有药物。医务人员可以告诉您 UBRELVY 与其他药物一起使用是否安全。

请保存一份您使用的药物清单，并在获得新药时出示给您的医务人员或药师。

我应该如何服用 UBRELVY？

- 请严格按照医务人员的指示服用 UBRELVY。
- UBRELVY 可随餐服用，也可不随餐服用。
- 大多数患者在服用第一片药片后 2 小时可根据需要服用第二片药片。
- 如果您摄入葡萄柚或葡萄柚汁或正在服用以下药物，则不应在 24 小时内服用第二片药片：
 - 维拉帕米
 - 环孢菌素
 - 环丙沙星
 - 氟康唑
 - 氟伏沙明
- 尚不清楚在 30 天内服用 UBRELVY 治疗 8 次以上偏头痛是否安全。
- 您应写下您出现头痛的时间以及服用 UBRELVY 的时间，以便与医务人员讨论 UBRELVY 对您的效果。
- 如果您过量服用 UBRELVY，请立即致电医务人员或前往最近的医院急诊室。

UBRELVY 可能有哪些副作用？

UBRELVY 可能会导致严重的副作用，包括：

- 过敏反应。在您服用 UBRELVY 后，可能会发生过敏反应。大多数反应在数小时内发生，并不严重。有些反应可能在服用 UBRELVY 后几天发生。如果您出现以下任何症状，请立即致电医务人员或寻求紧急帮助，这些症状可能是过敏反应的一部分：
 - 面部、口腔、舌头或咽喉肿胀
 - 呼吸困难

UBRELVY 最常见的副作用是恶心和嗜睡。

以上并未涵盖 UBRELVY 可能引起的全部副作用。请致电医务人员，获取有关副作用的医学建议。您可以拨打 1-800-FDA-1088 向 FDA 报告副作用。

我应该如何储存 UBRELVY？

- 将 UBRELVY 储存在 68°F 至 77°F (20°C 至 25°C) 的室温下。

将 UBRELVY 和所有药物存放在儿童接触不到的地方。

有关安全有效地使用 UBRELVY 的基本信息。

有时候，医生会出于《患者信息》手册中未列出的目的开具药物。请勿将 UBRELVY 用于其处方目的以外的其他疾病。请勿将 UBRELVY 提供给其他人，即使其症状与您相同。本品可能会对他们造成伤害。您可以向您的药师或医务人员索取为医务人员撰写的 UBRELVY 信息。

UBRELVY 的成分是什么？

活性成分：Ubrogepant

非活性成分：胶态二氧化硅、交联羧甲基纤维素钠、甘露醇、微晶纤维素、聚乙烯吡咯酮醋酸乙酯共聚物、氯化钠、硬脂富马酸钠和维生素 E 聚乙二醇琥珀酸酯。

生产委托方：

AbbVie Inc.

North Chicago, IL 60064

© 2023 AbbVie. 保留所有权利。

UBRELVY 及其设计是 AbbVie 旗下公司 Allergan Pharmaceuticals International Limited 的商标。

我们鼓励您向美国食品药品监督管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 报告处方药的不良反应。请访问 www.fda.gov/medwatch 或致电 1-800-FDA-1088。

如果您支付药品费用存在困难，AbbVie 可能会提供帮助。请访问 AbbVie.com/myAbbVieAssist 了解更多信息。

参考号：20079163 修订日期：2023 年 6 月

LAB-9720 英语 主文件

LAB-9787 简体中文 主文件

LAB-10577