

УБРЕЛВИ® (ю-брел-ви)
(уброгепант), таблетки для перорального применения

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для получения полной инструкции по применению
лекарственного препарата обратитесь к листку-вкладышу

Информация для
пациента

Ознакомьтесь с инструкцией по применению лекарственного препарата УБРЕЛВИ® для пациента перед началом приема и перечитывайте ее каждый раз, начиная новую упаковку. В инструкции может появиться новая информация. Эта краткая инструкция по применению лекарственного препарата не является исчерпывающей и не заменяет консультацию врача по поводу вашего заболевания или лечения. Для получения копии полной инструкции по применению препарата посетите веб-сайт по адресу www.UBRELVY.com или позвоните по телефону 1-844-4-UBRELVY (1-844-482-7358).

Что такое УБРЕЛВИ? УБРЕЛВИ — это рецептурный лекарственный препарат, применяемый для неотложного лечения приступов мигрени у взрослых с аурой или без. УБРЕЛВИ не используется для профилактики мигрени. Неизвестно, является ли препарат УБРЕЛВИ безопасным и эффективным у детей.	Ведите список принимаемых лекарственных препаратов и покажите его лечащему врачу или фармацевту при назначении Вам нового препарата.	Общие сведения об эффективном и безопасном использовании препарата УБРЕЛВИ. Лекарственные препараты иногда назначаются по показаниям, отличающимся от перечисленных в инструкции по применению лекарственного препарата для пациента. Запрещается принимать препарат УБРЕЛВИ для лечения заболевания не по показаниям. Не давайте препарат УБРЕЛВИ другим людям, даже если у них те же симптомы, что у Вас. Препарат может причинить вред их здоровью. Вы также можете попросить у фармацевта или врача информацию о УБРЕЛВИ, предназначенную для медицинских работников.
Кому не следует применять УБРЕЛВИ? Не принимайте препарат УБРЕЛВИ: - Если Вы принимаете лекарственные препараты, известные как сильный ингибитор CYP3A4, таких как кетоконазол, кларитромицин или итраконазол. Если Вы не уверены, относится ли принимаемый Вами препарат к ним, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Ваш лечащий врач может сообщить Вам, безопасно ли принимать препарат УБРЕЛВИ совместно с другими лекарственными препаратами. - У Вас аллергия на уброгепант или любой из компонентов препарата УБРЕЛВИ. Список всех ингредиентов препарата УБРЕЛВИ приведен в конце этой краткой инструкции по применению лекарственного препарата для потребителя. Перед началом приема УБРЕЛВИ сообщите врачу обо всех ваших заболеваниях, особенно если Вы: - У Вас проблемы с печенью. - У Вас проблемы с почками. - Вы беременны или планируете забеременеть. Данные о вреде УБРЕЛВИ для плода неизвестны. - Регистр воздействия на беременность: Существует Регистр воздействия на беременность для женщин, принимающих препарат УБРЕЛВИ. Целью этого регистрового исследования является сбор информации о состоянии Вашего здоровья и здоровья Вашего ребенка. Поговорите со своим лечащим врачом или позвоните по телефону 1-833-277-0206, чтобы зарегистрироваться в этом регистре. Вы также можете посетить веб-сайт по адресу http://emprespregnancyregistry.com. - Вы кормите грудью или планируете грудное вскармливание. Неизвестно, проникает ли УБРЕЛВИ в грудное молоко. Сообщите врачу обо всех принимаемых препаратах, в том числе рецептурных, безрецептурных препаратах, витаминах и растительных добавках. В особенности сообщите своему лечащему врачу, если Вы принимаете что-либо из перечисленного ниже, поскольку вашему лечащему врачу может потребоваться изменить дозу препарата УБРЕЛВИ: - верапамил - циклоспорин - ципрофлоксацин - флуконазол - флувоксамин - фенитоин - барбитураты - рифампин - зверобой - хинидин - карведилол - эльтромбог - куркумин Это не полный список лекарственных препаратов, которые могут повлиять на действие препарата УБРЕЛВИ. Ваш лечащий врач может сообщить Вам, безопасно ли принимать препарат УБРЕЛВИ совместно с другими лекарственными препаратами.	Как следует принимать УБРЕЛВИ? - Принимайте препарат УБРЕЛВИ в точном соответствии с указаниями врача. - Принимайте УБРЕЛВИ независимо от приема пищи. - Большинство пациентов могут принять вторую таблетку через 2 часа после приема первой таблетки, по мере необходимости. - Вам не следует принимать вторую таблетку в течение 24 часов, если Вы употребили грейпфруты или грейпфрутовый сок или приняли лекарственные препараты, которые могут включать следующие: - верапамил - циклоспорин - ципрофлоксацин - флуконазол - флувоксамин - Неизвестно, безопасен ли прием препарата УБРЕЛВИ при лечении более чем 8 эпизодов головных болей при мигрени в течение 30 дней. - Вам следует записывать, когда у Вас возникают головные боли, и когда Вы принимаете препарат УБРЕЛВИ, чтобы Вы могли поговорить со своим врачом о том, как УБРЕЛВИ действует на Вас. - Если Вы приняли слишком много препарата УБРЕЛВИ, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.	Какие вещества входят в состав препарата УБРЕЛВИ? Активный ингредиент: уброгепант. Вспомогательные вещества: коллоидный диоксид кремния, кроскармеллоза натрия, маннитол, микрокристаллическая целлюлоза, сополимер поливинилпирролидона и винилацетата, хлорид натрия, стеарилфумарат натрия и витамин Е полиэтилен гликоль сукцинат. Произведено для: «ЭббВи Инк.» North Chicago, IL 60064 © 2023 «ЭббВи Инкорпорейтед». Все права защищены. Препарат УБРЕЛВИ и его дизайн являются товарными знаками «Аллерган Фармасьютикалс Интернейшнл Лимитед», компании «ЭббВи Инкорпорейтед».
	Каковы возможные побочные эффекты препарата УБРЕЛВИ? Препарат УБРЕЛВИ способен вызывать серьезные побочные реакции, в том числе: - Аллергические реакции. Аллергические реакции могут развиваться после приема препарата УБРЕЛВИ. Большинство реакций возникали в течение нескольких часов и не были серьезными. Некоторые реакции могут возникать через несколько дней после приема препарата УБРЕЛВИ. Немедленно позвоните своему лечащему врачу или обратитесь за неотложной помощью, если у Вас возникнут какие-либо из следующих симптомов, которые могут быть проявлением аллергической реакции: - отеки лица, рта, языка или горла; - затрудненное дыхание. Наиболее распространенными побочными эффектами препарата УБРЕЛВИ являются тошнота и сонливость. Это не все возможные побочные эффекты препарата УБРЕЛВИ. Позвоните своему лечащему врачу, чтобы получить медицинскую консультацию касательно побочных эффектов. О возникших побочных эффектах можно сообщить в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) по телефону: 1-800-FDA-1088.	О возникших побочных эффектах при применении препаратов, отпускаемых по рецепту, сообщайте в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Посетите веб-сайт www.fda.gov/medwatch или позвоните по телефону 1-800-FDA-1088. Если у Вас возникли финансовые трудности с оплатой лекарственного препарата, компания «ЭббВи» может Вам помочь. Посетите веб-сайт AbbVie.com/myAbbVieAssist, чтобы узнать больше. Номер: 20079163 Пересмотрено: июнь 2023 г.
	Как следует хранить препарат УБРЕЛВИ? Храните УБРЕЛВИ при комнатной температуре от 68 °F до 77 °F (от 20 °C до 25 °C). Храните препарат УБРЕЛВИ и другие лекарственные препараты в недоступном для детей месте.	LAB-9720 МАСТЕР-ВЕРСИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ LAB-9786 МАСТЕР-ВЕРСИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ LAB-10575